

## 意見書(医師記入)

福富保育園 園長

園児名 \_\_\_\_\_

○該当疾患に☑をお願いします。

	病名
<input type="checkbox"/>	麻疹(はしか)
<input type="checkbox"/>	風疹
<input type="checkbox"/>	水痘(水ぼうそう)
<input type="checkbox"/>	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
<input type="checkbox"/>	結核
<input type="checkbox"/>	咽頭結膜熱(プール熱) 原因:アデノウイルス
<input type="checkbox"/>	流行性角結膜炎(アデノウイルス)
<input type="checkbox"/>	百日咳
<input type="checkbox"/>	腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111 など)
<input type="checkbox"/>	急性出血性結膜炎
<input type="checkbox"/>	髄膜炎菌性髄膜炎
<input type="checkbox"/>	ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。

年 月 日から登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関名 \_\_\_\_\_

※かかりつけ医の皆様へ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について意見書の記入をお願いします。

※保護者の皆様へ

上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する際には、この「意見書」を保育園に提出して下さい。

～～病名・感染しやすい期間・登園のめやす一覧～～

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症 1 日前から発疹出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過してから
風しん	発疹出現の前 7 日から後 7 日間くらい	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発疹出現 1～2 日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化 (かさぶた) してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜熱 (プール熱) 原因：アデノウイルス	発熱、喉の炎症、頭痛、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え、2 日経過してから
流行性角結膜炎 (アデノウイルス)	充血、目やに等、症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111 など)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1～2 週間、便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認められるまで
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後 1 週間 (ウイルス量は減少していくが数週間はウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事が取れること