

登園届（保護者記入）

福富こども園 園長

園児名

◎該当疾患にチェックをお願いします。また、登園のめやすにも達していればチェックをしてください。

✓	病名	感染しやすい期間	✓	登園のめやす
	溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間		抗菌薬内服後24～48時間経過している
	マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間		発熱や激しい咳が治まっている
	手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間		発しんが消失している
	伝染性紅斑（リンゴ病）	発疹出現前の1週間		全身状態が良い （普段の食欲、機嫌がもどっている）
	ウイルス性胃腸炎 （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等）	症状のある間と、症状消失後1週間（量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要）		嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食欲機嫌がもどっている
	ヘルパンギーナ	急性期の数日間 （便の中に1ヶ月程度ウイルスを排出しているので注意が必要）		発熱、口腔内の水泡、潰瘍が治まり、普段の食欲、機嫌がもどっている
	RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間		呼吸器症状が消失し、全身状態が良い（普段の食欲、機嫌がもどっている）
	带状疱疹	水泡を形成している間		すべての発疹が痂皮化（かさぶた）してから
	突発性発疹	—		解熱し、普段の食欲、機嫌がもどっている
	流行性角結膜炎	充血、目やに等の症状が出現した数日間		結膜炎の症状が消失していること
	ヒトメタニューモ	呼吸器症状のある間 （ウイルスの排出期間は1～2週間であるが、免疫低下状態では数週間から数か月排出される）		咳などが安定し、全身状態が良い （普段の食欲、機嫌がもどっている）

(医療機関名) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日受診)

において病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日から登園いたします。

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

保護者 \_\_\_\_\_

**※保護者の皆様へ**

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、裏面の登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。